verlissemenls agricoles

Abonnement

annuel: à l'ordre

180,00 F

Régisseur de Recettes

D.R.A.F. Nord Pas-de-Calais

SERVICE REGIONAL DU NORD-PAS-DE-CALAIS Cité Administrative - 59048 LILLE Cedex - Tél. (20) 52.00.25

LABORATOIRE REGIONAL D'ANALYSES PHYTOSANITAIRES
Z.A.L. - Rue Roger-Salengro - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. (21) 28.27.27



special grandes cultures

BULLETIN TECHNIQUE N° 18 DU 16 JUIN 1988

POMMES DE TERRE : Mildiou grave

CEREALES: Quelques cas de rouille

POIS: Tordeuse

FEVEROLES: Pucerons noirs



POUR LES AVERTISSEMENTS TELEMATIQUES APPELEZ LE 36 15 CODE ARTEL

POMMES DE TERRE

MILDIOU

SITUATION:

Attaques graves en parcelles en Flandres Intérieure et Maritime, également quelques symptômes en régions de Bapaume, St Pol, Montreuil, très partiels dans la plaine de Lens. Peu de cas signalés dans les régions de Lille et Plaine de la Lys malgré de nombreux tas de déchets contaminés.

Ces observations confirment le modèle de risque : risques importants en Flandres et région d'Arras.

PRECONISATIONS:

Si utilisation de contact, traitez avant le 19 juin.

Si un fongicide systémique a déjà été fait, le renouveler à 10 - 12 jours pour Syrdate et Pulsan, à 8 jours pour Patafol dans les zones à risques importants.

Si Mildiou dans la parcelle, nous téléphoner.

BLES

SITUATION:

Localement redémarrage de Rouille jaune.

P.150

Service de la Protection des Végétaux Arras 1985 - Toute reproduction même partielle est soum

1865 AD - Imprimerie de la Station Nord - Pas-de-Calta

Pression de Rouille brune plutôt sur Fidel et Camp Remy notamment en Flandres.

Sur quelques parcelles très intensifiées en variétés sensibles (ex. : Apollo ...), l'Oïdium continue à progresser.

Quelques pucerons sur épis.

Léger vol de Cécidomyies.

PRECONISATIONS:

Dans la plupart des cas les interventions épis sont faites. Sur quelques parcelles traitées depuis près de 3 semaines avec fort redémarrage des maladies, une application anti Rouille Oïdium peut se justifier.

Observez les pucerons, ne traiter que sur constat sur épis.

Cécidomyies : observer le soir par temps calme.

BETTERAVES

Accalmie des vols de pucerons après"une pointe" le 13 juin.

POUR LES AVEISION

TAM Piègeage, mais encore limité de tordeuses sur la bordure côtière.

FEVEROLES

Intallations de colonies de pucerons noirs, un traitement peut se justifier avec un produit non toxique pour abeille (en partie fécondation croisée).

Attaques symptômes on régions de Bapaume, 5t Pol, Montreuil, très partiels dans la plaine de Lens. Peu de cas signales dans les régions de Lile et Plaine de la Lys malgré de nom

Ces observations confirment le modèle de risque : risques importants en Flandres région d'Aires.

: SNOT WEIGH

Si un tongicide systemique a deja été fait, le renouveler à 10 - 12 jours pour rdate et Pulsan, à 8 jours pour Patatol dans les zones à risques importants.

Si Mildioù dans la parcelle, nous téléphoner.

· MOTTAL

POMMES DE TERRE